$\int dx = x + C$	$\int a\,dx = ax + C$
$\int x\,dx = \frac{x^2}{2} + C$	$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C$
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, (n \neq -1)$	$\int u' u^n dx = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C,\ (n \neq -1)$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln\lvert x\rvert + C$	$\int \frac{u'}{u} dx = \ln\lvert u\rvert + C$
$\int \frac{1}{x+a} dx = \ln\lvert x+a\rvert + C$	$\int \frac{u'}{u+a} dx = \ln\lvert u+a\rvert + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int u' e^u dx = e^u + C$
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,\ (a > 0, a \neq 1)$	$\int u' a^u dx = \frac{a^u}{\ln a} + C,\ (a > 0, a \neq 1)$
$\int \text{sen}\, x\,dx = -\cos x + C$	$\int u' \text{sen}\, u\,dx = -\cos u + C$
$\int \cos x\,dx = \text{sen}\, x + C$	$\int u' \cos u\,dx = \text{sen}\, u + C$
$\int \tan x\,dx = -\ln\lvert\cos x\rvert + C$	$\int u' \tan u\,dx = -\ln\lvert\cos u\rvert + C$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$	$\int \frac{u'}{\cos^2 u} dx = \tan u + C$
$\int (1 + \tan^2 x) dx = \tan x + C$	$\int u'(1 + \tan^2 u) dx = \tan u + C$
$\int \frac{1}{\text{sen}^2 x} dx = -\cot x + C$	$\int \frac{u'}{\text{sen}^2 u} dx = -\cot u + C$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \text{arcsen}\, x + C$	$\int \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}} dx = \text{arcsen}\ u + C$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$	$\int \frac{u'}{1+u^2} dx = \arctan u + C$
$\int \frac{1}{a^2 + b^2 x^2} dx = \frac{1}{ab} \arctan \frac{bx}{a} + C$	$\int \frac{u'}{a^2 + b^2 u^2} dx = \frac{1}{ab} \arctan \frac{bu}{a} + C$
Somma e sottrazione	$\int (u \pm v) dx = \int u dx \pm \int v dx$
Integrazione per parti	$\int u dv = uv - \int v du$
Formula di Newton-Leibniz	$\int_a^b f(x) dx = F(x)\Big\rvert_a^b = F(b) - F(a)$

Essendo ***u***, ***v*** funzioni di *x*; ***a***, ***n***, ***C*** costanti.